

Cód.	Nombre	Numerador	Denominador	Valor	Fuente	Año actualización	Observaciones
A.10	Tasa de mortalidad por suicidio	715	3480221,777	20,54466772	MSP. Estadísticas Vitales. Certificado Defunción	2016	Nº de defunciones ocurridas por Lesiones autoinfligidas intencionalmente durante el año acaecido/Nº total de población estimada para el año * 100000 Indicador 3.4.2 de los ODS
A.8	Esperanza de vida al nacer por sexo			Hombres 73,99;	INE	2016	Estimación para 2017
	Proporción de la población con grandes gastos en salud por hogar como porcentaje del total de los gastos o ingresos de los hogares						Indicador 3.8.2 de los ODS.
A.9							
B.1	Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años	428	229964,3902	1,861157719	MSP. Estadísticas Vitales. Certificado Defunción	2016	Nº de defunciones en menores de 5 años durante el año acaecido/Nº total de población de menores de 5 años estimada para el año * 1000 Indicador 3.2.1 de los ODS
B.10	Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad	120	122438,127	0,980086865	MSP. Estadísticas Vitales. Certificado Nacido Vivo	2016	Nº de nacimientos de mujeres de entre 10 y 14 años/Nº total de población estimada en ese grupo de edad * 1000 Indicador 3.7.2 de los ODS
B.10	Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad	6578	130748,1645	50,3104577	MSP. Estadísticas Vitales. Certificado Nacido Vivo	2016	Nº de nacimientos de mujeres de entre 15 y 19 años/Nº total de población estimada en ese grupo de edad * 1000 Indicador 3.7.2 de los ODS
B.11	Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años, desagregando tres categorías: antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años.			ND			

<b>B.13</b>	Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 24 años que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años								Indicador 12.4 de la Guía operacional adaptado. Desagregando tres categorías: antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años	Es indicador no se puede calcular con las fuentes de información de Estadísticas Vitales
<b>B.14</b>	Número de centros de salud con servicios o espacios amigables para adolescentes por cada 100.000 adolescentes.	71 servicios públicos y privados en todo el territorio	510.000 adolescente (de 10 a 19)	13.9				2017		
<b>B.15</b>	Porcentaje de hijos nacidos vivos tenidos en la adolescencia y en la juventud que no fueron planificados	4447	7224	61,55869324	MSP. Estadísticas Vitales. Sistema Informático Perinatal			2016	Indicador 12.5 de la Guía operacional adaptado	Número de NV de mujeres entre 10 y 19 años que no fueron planificados/total de NV de mujeres de entre 10 y 19 años *100
<b>B.17</b>	Porcentaje de demanda satisfecha de anticoncepción de emergencia entre mujeres menores de 30 años			ND					Indicador 14.3 de la Guía operacional adaptado	
<b>B.18</b>	Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos nacidos vivos, según número de hijos								Indicador 15.3 de la Guía operacional adaptado	
<b>B.9</b>	Porcentaje de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que tienen información y conocimiento sobre sexualidad y reproducción adecuados para sus respectivas edades			ND					Indicador 11.3 de la Guía operacional adaptado	
<b>C.8</b>	Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas	19970	3.480.222	573,81	MSP. Estadísticas Vitales			2016	Indicador 3.4.1 de los ODS	Defunciones ocurridas por Enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (J40-J47)/ N° total de población estimada para el año * 100000

Número de hospitalizaciones por complicaciones del aborto			ND			Indicador 42.2 de la Guía operacional adaptado
<b>D.10</b> desagregado por grupos de edad Existe en el país legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las siguientes causas: a) por la sola voluntad de la mujer, b) por violación o incesto, c) en caso de peligro para la vida de la mujer, d) para preservar la salud de la mujer y e) otras causas.			SI	MSP		
<b>D.11</b> Porcentaje de centros de atención de la salud que disponen de medicamentos para aborto y cuentan con personal capacitado y material para realizar abortos seguros y			ND			Indicador 42.6 de la Guía operacional adaptado
<b>D.12</b> proporcionar cuidados posteriores al Porcentaje de parejas y personas en condición de infertilidad o subfertilidad que reciben atención para fertilización asistida			ND			Indicador 43.3 de la Guía operacional
<b>D.13</b> Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales	45370	47058	96,41	MSP. Estadísticas Vitales	2016	Indicador 45.3 de la Guía operacional
<b>D.15</b> Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado			99,96%		2016	Indicador 3.1.2 de los ODS
<b>D.16</b> Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones informadas con respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva			ND			Indicador 5.6.1 de los ODS
<b>D.17</b> El país cuenta con leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres de 15 a 49 años de edad el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a			Si	MSP		
<b>D.18</b> información y educación en la materia. Porcentaje de centros de atención de la salud que ofrecen servicios de salud sexual y salud reproductiva integral			ND			Indicador 37.6 de la Guía operacional adaptado



Código	Nombre	Numerador	Denominador	Valor	Fuente	Año actualización	Observaciones
C.5	Porcentaje de centros de atención de salud que han incluido el cuidado paliativo como prestación básica						Indicador 29.2 de la Guía operacional adaptado
D.1	Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave.						
D.23	Porcentaje de mujeres que conocen su diagnóstico de VIH durante el embarazo, parto y puerperio.						
D.3 i)	Porcentaje de personas que viven con el VIH						Indicador 38.1 de la Guía operacional adaptado.
D.3 ii)	Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento						Indicador 38.1 de la Guía operacional adaptado.
D.3 iii)	Porcentaje de personas que se encuentran en tratamiento integral para el VIH que logran la supresión de la carga vírica						Indicador 38.1 de la Guía operacional adaptado.